

TJEKLISTE TIL GOD SMITTEBESKYTTELSE I KALVESTALDEN

1. Fokus på råmælks-management for at sikre god immunisering og modstandskraft overfor sygdom

2. Jodbehandling af kalvens navle umiddelbart efter kælvning for at forhindre navlebetændelse

3. Undgå at slæbe smitte rundt mellem staldafsnit og mellem bokse

- Skift støvler og handsker, og måske endda tøj, når du skifter staldafsnit. Vask støvler og skift handsker mellem grupper, samt hvis du har været inde i en boks
- Håndtér de yngste kalve først og syge kalve til sidst. Flyt syge kalve til en sygeboks, hvis muligt
- En kost til hver stald. Man bør ikke blande redskaber staldafsnittene imellem

4. Hygiejne i forbindelse med mælkefodring

- Mælketaxaen skal rengøres grundigt, ikke bare i selve tanken. Alle mælkerester i slanger og studser skal væk
- Suttespande eller skåle skal rengøres efter mælkefodring. Samme kalv skal beholde samme suttespande eller skål. Husk udskiftning og rengøring af sutter, hvis der anvendes suttespande
- Husk rengøring med sæbe før desinfektion. Desinfektionen virker ikke uden forudgående rengøring med alkalisk (basisk) sæbe.

5. Husk kalvenes suttebehov

- Narresutter placeres i nærheden af hvor kalven tildeles mælk, så kalven nemt kan komme til dem efter mælkefodring. Suttene placeres i en højde, så gødningsforurening undgås. Når suttebehovet opfyldes, er der mindre risiko for at kalvene sutter på hinanden eller inventar
- Sutterne rengøres med sæbe og desinfektion efter behov og mellem hver kalv. Slidte narresutter skal skiftes

6. Alt-ind-alt-ud

- Når dyrene skifter boks, skal alt rengøres og desinficeres
- Brug ikke højtryksrensere i nærheden af kalvene, da smitstoffer kan spredes langt via vanddråberne. Ved grundig iblødsætning kan der vaskes med lavere tryk

7. Små stabile hold på 4-6 kalve pr. boks

- Holdene skal følge hinanden og flyt kalvene så lidt som muligt. Så udsættes de ikke for et nyt miljø og nye smitstoffer samt stress i forbindelse med flytning
- Der bør optimalt set være en fast væg mellem fællesboksene, så dyrene ikke kan røre hinanden. Holdene må ikke dele vandkop
- Lav belægningsgrad reducerer smittepresset. Jo mere plads, jo bedre

8. Sørg for en ren og velstrøet boks

- Det mindsker kontakten med lort og holder kalven varm og tør

9. God hygiejne ved fodring (hold lorten fra foderet)

- En løsning kan være fodring i krybber frem for på gulvet i fællesbokse
- Undgå at dyr krydser foderbordet

TJEKLISTE TIL GOD SMITTEBESKYTTELSE I KALVESTALDEN

10. Tjek om luftcirkulationen er optimal

- Kalve skal have frisk luft, men må ikke få træk. Luftcirkulationen kan tjekkes med røgpiller

11. Pas på dine kalve i kulden

- Øg mælkemængden når dagtemperaturen kommer under 15-18 grader, da kalvene så vil bruge mere energi på at holde varmen. Undgå at hæve tørstof, hvis du bruger mælkepulver, da det kan give problemer med diarre
- Ekstra strøelse, dækkener, tempereret vand og plader til at skærme af for kulde og vind kan bidrage til at reducere varmetabet
- Tjek og hæv eventuelt udfodringstemperaturen på mælken. Skålene er kolde og mælken nedkøles dermed hurtigere

Har du spørgsmål eller behov for sparring, er du velkommen til at kontakte vores dygtige kalveteam.



SIMONE L. P. BALTHERSEN

Kvægrådgiver

9615 3042 / 2484 4336

slb@fjordland.dk



CAMILLA SCHILLING PEDERSEN

Kvægrådgiver

9663 0563 / 2127 0179

csp@fjordland.dk